



孕婦被親密伴侶暴力虐待的首個全港性調查 關注孕婦被虐的危機

婦女遭受親密伴侶（現任或前任丈夫、同居伴侶、男友或約會對象）暴力對待是一個值得關注的社會健康問題，她們不但面對受傷的危機，亦可能對健康造成短期或長期的負面影響。若在懷孕期間，孕婦受到親密伴侶暴力對待，不單會危害婦女的健康與安全，更會危及胎兒之福祉；因此，確定孕婦是否遭受親密伴侶暴力對待是絕不容忽視，然後更須要提供相應的預防措施及介入治療。



撰文：
香港大學李嘉誠醫學院
護理學系
副教授
羅鳳儀博士



撰文：
香港大學
社會工作及社會行政學系
助理教授
陳高凌博士



撰文：
香港大學李嘉誠醫學院
婦產科學系
名譽臨床醫學副教授
梁永昌醫生



撰文：
香港大學李嘉誠醫學院
護理學系
助理教授
方以德博士

世界各國已有不少文獻記載婦女懷孕期間遭受親密伴侶暴力對待的調查資料，但香港在這方面的有關數據則非常缺乏，因為本地並不設對孕婦進行有關伴侶暴力行為

的例行調查，而基於「家醜不外傳」的傳統觀念，有關調查亦難以進行。香港實在有需要調查懷孕期間是否婦女遭受伴侶暴力對待的高危期及高危因素，以便作出預防或介入

有關虐待行為。有鑑於此，在2005年7月至2006年4月期間，香港大學李嘉誠醫學院護理學系、婦產科學系、港大社會工作及社會行政學系，聯同醫院管理局轄下6個分區的7間婦產科中心進行首個全港性孕婦被親密伴侶暴力虐待的調查。

研究方法

2,975名在醫院參加產前診療的孕婦獲邀參與是項調查。本研究採用虐待評估鑑別調查(Abuse Assessment Screen)方法評估親密伴侶虐待行為的情況，另外參加者的人口統計資料則以人口統計問卷方式獲取。

研究結果

277名(9.3%)孕婦表示遭受親密伴侶虐待，按虐待方式分類，其中245名(8.2%)遭受精神虐待，76名(2.6%)遭受身體或性虐待。

親密伴侶施虐分區統計

6個分區中，親密伴侶施虐的普遍性如下：香港西有4.2%、香港東9.5%、九龍西有9.6%、新界西10.9%、九龍中11.1%，而九龍東則有11.4%。

高危因素

- **意外懷孕**：意外懷孕婦女較有計劃懷孕婦女受精神或身體虐待的風險高出1倍。
- **需要接受社會支援服務**：需要接受社會支援服務(例如醫療服務、家庭服務、託兒服務、經濟支援等)孕婦面對身體受虐的風險較不需要社會支援服務的孕婦高出3倍。
- **負債**：相對沒有負債的孕婦而言，負債的孕婦遭受精神虐待的風險高1.5倍，而遭受身體虐待的風險則高出2倍。
- **失業**：失業的孕婦相對在職孕婦受到身體虐待的風險高2倍。
- **健康問題**：健康有問題的孕婦較健康孕婦受身體虐待的風險高1.5倍。
- **姻親關係不理想**：與姻親有爭執的孕婦較姻親關係良好的孕婦遭受精神及身體虐待的風險則分別高40%及30%。

結論及建議

儘管中國人強調「家和萬事興」的和諧關係，社會上仍有部分孕婦遭受親密伴侶虐待。不同背景的孕婦所面對的風險亦有所不同，

意外懷孕、需要接受社會支援、負債、失業、健康有問題及與姻親關係不佳的孕婦所面對虐待的風險相對較高。

為防止親密伴侶暴力行為，第一層面預防措施可針對促進家庭關係及育兒技巧，以減低懷孕及產後出現遭受虐待的機會，有關措施包括：

- 進行懷孕期間有關伴侶虐待的例行鑑別程序；
- 助產士或社會工作者對高危受虐孕婦在懷孕期間及產後進行家訪；
- 向孕婦及她們的伴侶提供心理或社會支援計劃；
- 對醫護人員進行鑑別親密伴侶虐待行為的培訓；及
- 推行有關家庭和諧及關注伴侶暴力行為的社區教育。

再者，第二層面預防措施應專注提早鑑別及介入行動，包括：

- 為以往曾遭受親密伴侶暴力行為的孕婦評估風險；
- 提供「自強充權」課程給受虐婦女，藉以減低虐待行為的嚴重性及次數；及受親密伴侶虐待之負面影響。